

HENRY

Hydraulic Engineering Repository

Ein Service der Bundesanstalt für Wasserbau

Article, Published Version

Pasenu, Horst; Ulrich, Johannes

Riesen- und Großrippeln in der Deutschen Bucht und Untersuchungen ihrer Bewegungsvorgänge in einem Testgebiet (Lister Tief) (Kurzfassung)

Die Küste

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit/Provided in Cooperation with:
Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen (KFKI)

Verfügbar unter/Available at: <https://hdl.handle.net/20.500.11970/101065>

Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:

Pasenu, Horst; Ulrich, Johannes (1975): Riesen- und Großrippeln in der Deutschen Bucht und Untersuchungen ihrer Bewegungsvorgänge in einem Testgebiet (Lister Tief) (Kurzfassung). In: Die Küste 27. Heide, Holstein: Boyens. S. 61-61.

Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:

Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of the restrictive license will be binding.



Riesen- und Großrippeln in der Deutschen Bucht und Untersuchungen ihrer Bewegungsvorgänge in einem Testgebiet (Lister Tief)

Von Horst Pasenau und Johannes Ulrich

Summary

In a lot of regions the bottom of the North Sea is covered with large ripple fields, especially in estuaries and tidal channels. A great number of echo sounding profiles (29.500 n. m.) were evaluated to determine the boundaries of these areas and to describe the dimension of patterns. Special investigations of the hydrographic situation, the distribution of deposits and the migration of ripples under the influence of tidal currents only, were carried out in a testing area in the Lister Tief on eleven cruises since 1971.

Unter Verwendung umfangreichen Lotungsmaterials verschiedener im Bereich der deutschen Nordseeküste tätiger Institutionen wurden Bodenformen analysiert, die als Indikatoren für Sandbewegungsvorgänge in der Deutschen Bucht dienen können. Die größten zusammenhängenden Rippelfelder sind in den Ästuarien von Ems, Weser, Jade und Elbe sowie in den Tidekanälen zwischen den der Küste vorgelagerten Inseln, Sänden und Wattflächen zu finden. In einem ausgesuchten Testfeld im Lister Tief, nördlich Sylt, wurde die Verlagerung der Rippeln unter dem Einfluß der Gezeiten über einen Zeitraum von 4 Jahren (1971–1974) hinweg beobachtet und so die Grundlage zu einer Berechnung der Sandbilanz dieses Raumes gelegt.

Der Beitrag, dessen vollständiger Wortlaut in den „Proceedings of the 14th Coastal Engineering Conference“ veröffentlicht wird, fußt im wesentlichen auf Untersuchungen, über die bereits an anderen Stellen berichtet wurde:

- ULRICH, J.: Die Verbreitung submariner Riesen- und Großrippeln in der Deutschen Bucht. Ergänzungsheft zur Deut. Hydrogr. Zeitschr., Reihe B, 14, 1973.
ULRICH, J. und H. PASENAU: Morphologische Untersuchungen zum Problem der tidebedingten Sandbewegung im Lister Tief. Die Küste, 24, 95–112, 1973.